

# Ayrshire

## Analyse de conformation - Femelle

<b>Nom/n° d'étable</b>	<b>Propriétaire</b>	<b>Date de la visite</b>		
<b>N° d'enregistrement</b>	<b>N° d'enregistrement du père</b>	<b>Date de naissance</b>	<b>Date de vêlage</b>	<b>N° de lactation</b>

Section	Pointage	Caractères descriptifs	Caractères déficients
---------	----------	------------------------	-----------------------

<b>Croupe (10 %)</b>		Angle de la croupe (30 %)	haut	1 2 3 4 5 6 7 8 9	bas		
		Largeur aux ischions (30 %)	étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large		
		Force du rein (25 %)	faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	fort		
		Position du trochanter (15 %)	reculé	1 2 3 4 5 6 7 8 9	avancé		

<b>10</b>	Anus avancé <sub>2</sub>	<b>13</b>	Att. queue haute <sub>1</sub>
<b>11</b>	Att. queue avancée <sub>1,5</sub>	<b>15</b>	Mauvaise inclin. Bassin <sub>0</sub>
<b>12</b>	Att. queue rentrante <sub>1</sub>		

<b>Système mammaire (40 %)</b>		Plancher de pis (4 %)	Incliné	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Incliné vers l'avant		
		Profondeur du pis (11 %)	profond	1 2 3 4 5 6 7 8 9	peu prof.		
		Texture du pis (15 %)	charnu	1 2 3 4 5 6 7 8 9	souple		
		Suspension médiane (13 %)	faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	forte		
		Attache avant (15 %)	faible	1 2 3 4 5 6 7 8 9	forte		
		Position trayons avant (5 %)	éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9	rapprochés		
		Hauteur attache arrière (13 %)	basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute		
		Largeur attache arrière (13 %)	étroite	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large		
		Position trayons arrière (7 %)	éloignés	1 2 3 4 5 6 7 8 9	rapprochés		
		Longueur des trayons (4 %)	courts	1 2 3 4 5 6 7 8 9	longs		

<b>22</b>	Avant-pis court <sub>1</sub>	<b>26</b>	Quartier improductif <sub>8</sub>
<b>23</b>	Arr.-pis court <sub>1</sub>	<b>27</b>	Trayon double <sub>1,5</sub>
<b>24</b>	Manque de forme <sub>1</sub>	<b>28</b>	Trayons av. trop arr. <sub>0,5</sub>
<b>25</b>	Quartier non équilibré <sub>1</sub>	<b>29</b>	Trayons arr. trop arr. <sub>0,5</sub>

<b>Puissance laitière (25 %)</b>		Stature (10 %)	courte	1 2 3 4 5 6 7 8 9	grande		
		Hauteur à l'avant-train (0 %)	basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute		
		Largeur du poitrail (22 %)	étroit	1 2 3 4 5 6 7 8 9	large		
		Profondeur du corps (22 %)	peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	profond		
		Capacité laitière (25 %)	ible capacité	1 2 3 4 5 6 7 8 9	grande capacité		
		Cote de chair (2 %)	basse	1 2 3 4 5 6 7 8 9	haute		
		Texture du pis (6 %)					
Force du rein (13 %)							

<b>42</b>	Côtes av. peu prof. <sub>1,5</sub>	<b>45</b>	Cotes peu arquées <sub>1,5</sub>
<b>43</b>	Arr. épaule faible <sub>1</sub>	<b>46</b>	Manque d'agencem. <sub>1</sub>
<b>44</b>	Dos faible <sub>1,5</sub>	<b>48</b>	Tête Indésirable <sub>1</sub>

<b>Pieds et membres (25 %)</b>		Angle du pied (13 %)	bas	1 2 3 4 5 6 7 8 9	incliné		
		Profondeur du talon (25 %)	peu prof.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	profond		
		Valeur combinée du pied (recherche)	fonctionnelle	1 2 3 4 5 6 7 8 9	non fonctionnelle		
		Qualité de l'ossature (12 %)	grossière	1 2 3 4 5 6 7 8 9	raffinée		
		Vue côté-membres arrière (15 %)	droits	1 2 3 4 5 6 7 8 9	coudés		
		Vue arrière membres (30 %)	vers l'int.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	droits		
		Vue avant des membres avant (recherche)	oux cagneux	1 2 3 4 5 6 7 8 9	genoux arqués		
		Locomotion (recherche)	non mobile	1 2 3 4 5 6 7 8 9	mobile		
Position du trochanter (5 %)							

<b>30</b>	anormalité de pince <sub>1,5</sub>	<b>34</b>	Raideur <sub>3</sub>
<b>31</b>	Paturons faibles <sub>1,5</sub>	<b>35</b>	Membres arrière reculés <sub>1,5</sub>
<b>32</b>	Jarrets gonflés <sub>1</sub>	<b>36</b>	Pieds avant ext. <sub>1</sub>
<b>33</b>	Manque d'os <sub>0</sub>		

<b>Classe</b>	<b>Pointage</b>	<b>Commentaires :</b>
---------------	-----------------	-----------------------